

santos futebol clube vs sport club corinthians

Exames de gravidez, geralmente chamados de testes de gravidez, detectam a presença da gonadotrofina coriônica humana (hCG) na urina ou sangue. A hCG é uma hormona produzida após a fecundação, quando um embrião se fixa na parede do útero.

No exame de gravidez caseiro, as tiras reagem à presença de hCG e mostram o resultado imediatamente. Esses testes estão amplamente disponíveis em farmácias e drogarias e podem detectar a gravidez em diferentes momentos, dependendo do tipo de exame.

Um tipo de exame de gravidez caseiro é o teste de gravidez de fluxo livre. Nesse teste, a mulher coloca algumas gotas de urina em um recipiente e, seguida, inclina o recipiente para que a urina passe sobre uma tira reagente. Esses testes detectam a presença de hCG a partir de 25 mUI/ml a 50 mUI/ml de urina. Portanto, eles podem detectar uma gravidez a partir de 4 a 5 dias após o atraso menstrual.

Outro tipo de exame de gravidez caseiro é o teste de gravidez digital. Esse teste apresenta o resultado de maneira digital, o que facilita a leitura do resultado. Geralmente, os testes digitais detectam a gravidez a partir de 10 mUI/ml de hCG na urina. Portanto, esses testes podem detectar uma gravidez um pouco antes do que os testes de fluxo livre, geralmente a partir de 3 a 4 dias após o atraso menstrual.

o de 2-4 horas. A mãe também deve passar pela placenta dentro de 2 a 4 horas após o parto. Navels deve ser mergulhados em uma solução de iodo para ajudar a secar e reduzir o risco de infecção por esta rota. recém-nascido

; Cria Care Towcester Vets

o.uk: artigo:

Entregar um bebê, chamado de cria, por ano. Cria Definida

o & Significado

te de pares da Nike e a China e o Vietnã,